



1er día de la erupción



4to día de la erupción

Sarampión

Es una enfermedad febril, aguda, exantemática, causada por el virus del sarampión, es sumamente contagioso.

Caso sospechoso: Toda persona de cualquier edad, de quién un trabajador de salud sospecha que tiene sarampión o rubéola, o todo caso que presente fiebre y erupción máculo papular generalizada, **NO vesicular**.

Periodo de incubación: 7 —21 días

Periodo de transmisibilidad: 4 días antes hasta 4 días después de la instalación de la erupción.



1er día de la erupción

***Caso confirmado notificado por la DISA II Lima Sur**

Fases de Sarampión

Prodrómica.

Dura de cuatro a cinco días. Se caracteriza por malestar general, fiebre alta, tos, coriza conjuntivitis, falta de apetito, puntos de color gris azulado sobre una base roja en la mucosa de la boca conocida como "manchas de Koplik".

Eruptiva.

Dura alrededor de cinco días. La erupción es eritematosa y se inicia en la región retroauricular (detrás de la oreja), luego compromete la cara y el cuello, en los tres días siguientes se extiende gradualmente hacia el tronco y las extremidades, no afecta la palma de las manos ni la planta de los pies.

Convalecencia.

La erupción disminuye progresivamente en el mismo orden en que apareció desde la cabeza a las extremidades, presentan descamación fina, la piel queda con manchas de color café claro.

