

ALERTA TEMÁTICA SELECTIVA:

DETERIORO COGNITIVO EN COMUNIDADES NATIVAS



[Estudio de los factores de riesgo de deterioro cognitivo en el medio rural: metodología y pilotaje desde la farmacia comunitaria](#)

Luis A. Martínez, Cristina García, Lucrecia Moreno
Farm Comunitarios. 2023 Apr 14; 15(2): 20–28.

Introducción

El deterioro cognitivo está mediado por la exposición a una gran variedad de factores de riesgo, entre los que la edad es el más relevante. El fenómeno global del envejecimiento de la población hace que conseguir separar los conceptos de envejecimiento y enfermedad sea una tarea de gran interés. En España, la población rural es un estrato particularmente envejecido que puede tener dificultades de acceso a los servicios sanitarios. Las farmacias comunitarias están ampliamente distribuidas en nuestra geografía y el farmacéutico es el sanitario más accesible para esta población tan vulnerable.

[Enlace a otros títulos PubMed](#)



Polimorfismos del gen de la apolipoproteína E en adultos mayores de 60 años con disminución de la memoria cognitiva y enfermedad de Alzheimer en diferentes poblaciones venezolanas

[Martínez, Silvia; Ochoa, Bárbara; Pérez, María Rafaela; Torrico, Fátima; García, Idemaro; García, Carmen Cristina.](#)

[Biomédica \(Bogotá\); Biomédica \(Bogotá\);42\(supl.1\): 116-129, mayo 2022.](#)

Introducción

La enfermedad de Alzheimer constituye un problema de salud pública que tiende a agravarse en el tiempo. Entre los factores genéticos de predisposición más importantes, se encuentra la presencia del alelo $\epsilon 4$ del gen APOE que codifica para la apolipoproteína E. Objetivo. Determinar las frecuencias alélicas y genotípicas de las isoformas de APOE en adultos mayores de 60 años con memoria cognitiva disminuida y Alzheimer, en la gran Caracas y en la comunidad indígena pemón de la zona Kamarata-Kanaimö, Estado Bolívar.

[ENLACE A OTROS TÍTULOS BVS REGIONAL](#)



[Depresión en adultos mayores de comunidades indígenas en Purús, Ucayali, Perú](#)

Keyla Jimena Fernández Vasquez ; Universidad Nacional de Ucayali, Perú
Revista Peruana de Medicina Integrativa, 2024 - rpmi.pe

Resumen

La depresión tiene una alta prevalencia en ancianos y posee características particulares. Se tuvo como objetivo determinar la prevalencia de depresión en ancianos de comunidades. El estudio se realizó en adultos mayores atendidos por el equipo de atención integral de salud a poblaciones excluidas y dispersas (AISPED) Purús, se recopilaron los datos mediante una ficha de recolección de datos y se aplicó el test de Yesavage versión corta de 15 ítems.

[ENLACE A OTROS TÍTULOS GOOGLE ACADÉMICO](#)

	The characterisation of subjective cognitive decline Prof Frank Jessen, MD^{a,b,c} frank.jessen@uk-koeln.de · Rebecca E Amariglio, PhD^d · Rachel F Buckley, PhD^{e,f,g} · Wiesje M van der Flier, PhD^{h,i} · Ying Han, MD^{j,k,l,m} · José Luis Molinuevo, MD^{n,o}, et al. Summary A growing awareness about brain health and Alzheimer's disease in the general population is leading to an increasing number of cognitively unimpaired individuals, who are concerned that they have reduced cognitive function, to approach the medical system for help. The term subjective cognitive decline (SCD) was conceived in 2014 to describe this condition. Epidemiological data provide evidence that the risk for mild cognitive impairment and dementia is increased in individuals with SCD. However, the majority of individuals with SCD will not show progressive cognitive decline. An individually tailored diagnostic process might be reasonable to identify or exclude underlying medical conditions in an individual with SCD who actively seeks medical help. ENLACE A OTROS TÍTULOS THE LANCET NEUROLOGY
	Características del deterioro cognitivo en el adulto mayor hospitalizado a nivel nacional Varela P., Luis, Chávez J., Helver, Gálvez C., Miguel, Méndez S., Francisco Revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, 2019 Introducción Determinar la frecuencia y grado de deterioro cognitivo del adulto mayor hospitalizado en el Perú, así como su asociación con otros síndromes y problemas geriátricos. En base a la información del estudio «Valoración Geriátrica Integral en adultos mayores hospitalizados a nivel nacional (Perú)», se incluyeron a 312 pacientes de 60 años o más. Se evaluó la frecuencia y severidad del deterioro cognitivo; y se comparó estos resultados con los principales síndromes y problemas geriátricos. ENLACE A OTROS TÍTULOS DE REPOSITORIO ALICIA
	Traducción y adaptación transcultural al contexto español del marco teórico <i>Person-Centred Practice Framework</i> Ana Choperena, Yvonne Gavela-Ramos, Marta Lizarbe-Chocarro, María José Galán-Espinilla, Begoña Errasti-Ibarrondo, Virginia La Rosa-Salas, Mónica Vázquez-Calatayud, Brendan McCormack, Ana Carvajal-Valcárcel Anales del Sistema Sanitario de Navarra vol.45 no.3 Pamplona, 2023 Fundamento: El cuidado centrado en la persona se ha convertido en un enfoque esencial a nivel global que pretende dar respuesta a todas las dimensiones que afectan a los complejos procesos de la atención sanitaria. El <i>Person Centred Practice Framework</i> (PCPF), desarrollado por McCormack y McCance facilita que los equipos multidisciplinares puedan entender y operativizar todas las dimensiones que participan en el desarrollo de una atención centrada en la persona. El objetivo del estudio fue obtener la primera versión española del marco PCPF traducida y adaptada a nuestro contexto español.